

傷寒來蘇全集

自序

世之補傷寒者百餘家究其所作不出二義一曰傷寒論
本文爲之註疏猶公穀說春秋也一則引仲景之來而
爲立論猶韓嬰說詩而爲外傳也然引徵者固不得斷
章取義之理而註疏者反多以辭害義之文初不知仲
景先師著傷寒雜病論合十六卷良法大備此靈素已
具諸病之體而明鍼法之巧妙至仲景復脩諸病之用
而詳方藥之準繩其常中之變變中之常靡不曲盡使
全書具在尋其所集盡可以見病知源自王叔和編次
傷寒雜病分爲兩書於本論削去雜病然論中雜病留

而未主者尚多是叔和有傷寒論之專名終不失傷寒
雜病合論之根蒂也名不附實是非混淆古人精義弗
彰是以讀之者鮮不旁門岐路莫知適從豈非叔和編
次之謬以禍之歟世謂治傷寒卽能治雜病豈知仲景
雜病論卽在傷寒論中且傷寒中又最多雜病夾雜其
間故傷寒與雜病合論則傷寒雜病之症治井然今傷
寒與雜病分門而頭緒不清必將以雜病混傷寒而妄
治之矣乃後人專爲傷寒著書自朱奉議出而傷寒之
書日多而傷寒之病日混非其欲傷寒之混也由不識
何病是傷寒自陶節菴出而傷寒之書更多非真傷寒

多也卽金匱中雜病亦盡指爲傷寒也世銅于邪說反以仲景書難讀而不知仲景書皆叔和改頭換面非本來面目也冠脉法序例于前集可汗不可汗等于後引列濕暘于太陽之首霍亂勞復等于厥陰之外雜亂見于六經之中是一部王叔和之書矣林億諸公校正不得仲景原集惑于傷寒論之名又妄編三百九十七法一百一十三方之數以附會叔和所定之傷寒於是欲知仲景之道更不可得成無已信古篤好矯然特出惜其生林億之後欲爲仲景功臣無由得其真傳故註仲景之書而仲景之旨多不合作明理論而傷寒之理反

不明因不得仲景傷寒雜病合論之旨故不能辨許叔微三方鼎立之謬反集之於註開疑端于後人豈非爲三百九十七法等說所誤乎由是方中行有條辨之作而仲景之規矩準繩更加敗壞名爲翻叔和之編實以滅仲景之活法也盧子由疏抄不編林億之數目不宗方氏之三綱意甚有見而又以六經謬配六義增標本形層本氣化氣等說仲景之法又何堪如此撓亂哉近日作者蜂起尙論愈奇去理愈遠條分愈新古法愈亂仲景六經反茅塞而莫辨不深可憫耶原夫仲景之六經爲百病立法不專爲傷寒一科傷寒雜病治無二理

咸歸六經之節制六經各有傷寒非傷寒中獨有六經也治傷寒者但拘傷寒不究其中有雜病之理治雜病者以傷寒論爲無關於雜病而置之不問將參贊化育之書悉歸狐疑之域愚甚爲斯道憂之于仲景書究心有年愧未深悉然稍見此中微理敢畧陳固陋名曰傷寒論翼不兼雜病者恐人未知原文合論之旨以雜病爲不足觀耳其當與否自有能辨之者

甲寅春慈谿柯琴序

傷寒論翼卷上

慈谿柯 琴韵伯著

雲間王陳梁次辰閱

全論大法第一

按仲景自序言作傷寒雜病論合十六卷則傷寒雜病未嘗分兩書也凡條中不冠傷寒者即與雜病同義如太陽之頭項強痛陽明之胃寔少陽之口苦咽乾目眩太陰之腹滿吐利少陰之欲寐厥陰之消渴氣上撞心等症是六經之爲病不是六經之傷寒乃是六經分司諸病綱非專爲傷寒一症立法也觀五經提綱皆指內

證惟太陽提綱爲寒邪傷表立五經提綱皆熱指証惟
太陰提綱爲寒邪傷裏立然太陽中暑發熱而亦惡寒
太陰傷熱亦腹痛而吐利俱不離太陽主外太陰主內
之定法而六經分症皆兼傷寒雜病也明矣因太陽主
表其提綱爲外感立法故叔和將仲景之合論全屬傷
寒不知仲景已自明其書不獨爲傷寒設所以太陽篇
中先將諸病線索逐件提清比他經更詳也其曰太陽
病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊
者名曰傷寒是傷寒另有提綱矣此不特爲太陽傷寒
之提綱即六經傷寒提綱亦不外是觀仲景獨於太陽

篇別其名曰傷寒曰中風曰中暑曰溫病曰濕痺而他
經不復分者則一隅之舉可以尋其一貫之理也其他
結胃藏結陽結陰結痰熱發黃熱入血室譫語如狂等
症或因傷寒或非傷寒紛紜雜沓之中正可以思傷寒
雜病合論之旨矣蓋傷寒之外皆雜病病名多端不可
以數計故立六經而分司之傷寒之中最多雜病內外
夾雜虛實互呈故將傷寒雜病而合參之正以台中見
涇渭之清濁此扼要法也叔和不知此旨謂痙濕暍三
種宜應別論則中風溫病何得與之合論耶以三症爲
傷寒所致與傷寒相似故此見之則中風非傷寒所致

溫病與傷寒不相似者何不爲之另列耶霍亂是肝邪
爲患陰陽易瘥後勞復皆傷筋動血所致咸當屬於厥
陰何得另立篇目叔和分太陽三証於前分厥陰諸証
於後開後人分門類症之端豈知仲景約法能合百病
無該于六經而不能逃六經之外只在六經上求根本
不在諸病名目上尋枝葉乃叔和以私意紊亂仲景之
原集於勞復後重集可發汗不可發汗諸篇如弱反在
開濡反在巔微反在上而氣不下不知如何名反豈濡
弱微濡等脉有定位乎此類姑不悉辨其云大法春夏
宜發汗冬宜吐秋宜下詔小值其時當汗不汗當下不

下必待其時耶而且利水清火補溫和鮮等法慨不言
及所以令人稱仲景只有汗吐下三法寔由于此夫四
時者衆人所同受病者因人而異汗吐下者因病而施
也立法所以治病非以治時自有此大法之謬後人因
有隨時用藥之迂論麻黃桂枝湯者謂宜于冬月嚴寒
而三時禁用論白虎湯者謂宜于夏而大禁秋冬後與
立夏之前夫必先歲氣毋伐天和寒熱溫涼之逆用為
乎人飲食調理之常耳仲景因症立方豈隨時定劑哉
當知仲景治法悉本內經按岐伯曰調治之方必別陰
陽之病治陰之病治陽定其中外各守其鄉外者外治

內者內治從外之內者治其外從內之外者調其內從
內之外而盛于外者先調其內後治其外從外內而盛
于內者先治其外後調其內中外不相及則治主病微
者調之其次乎之盛者奪之寒熱溫涼衰之以屬隨其
攸利此大法也仲景祖述龐遺憲章昭著本論所稱發
熱惡寒發於陽無熱惡寒發於陰者是陰陽之別也陽
病製白虎承氣以存陰陰病製附子茱萸以扶陽外
麻桂以治表內者用硝黃以治裏其于表虛裏實表熱
裏寒發表和表攻裏救裏病有淺深治有次第方有輕
重是定其中外各守其綱也太陽少陽併病小發汗太

陽々明合病用麻黃湯是從外之內者治其外也陽明
病發熱汗出不惡寒反惡熱用梔鼓湯是從內之外者
調其內也發汗不解蒸蒸發熱者從內之外而盛于外
調胃承氣先調其內也表未解而心下痞者從外之內
而盛于內當先解表乃可攻痞是先治其外後調其內
也中外不相及是病在半表半裏大小柴治主病也此
卽所謂微者調之其次平之用白虎梔鼓小承氣之類
盛者奪之則用大承氣陷胃抵當之類矣所云觀其脉
症知犯何逆以法治之則寒熱溫涼衰之以屬隨其攸
利之謂也若拘四時以拘法限三法以治病遇病之變

遷則束手待斃矣且汗下吐之法亦出於岐伯而利水
清火調補等法悉具焉其曰有邪者清形以為汗在皮
者汗而發之寔者散而瀉之此汗家三法中滿者瀉之
于內血寔者宜決之是下之二法高者因而越之謂吐
下者引而竭之謂利小便慄悍者按而收之是清火法
氣虛宜掣引之是調補法也夫邪在皮毛猶未傷形故
仲景製麻黃湯急汗以發表邪入肌肉是已傷其形故
用桂枝湯歠稀熱粥以解肌是漬形以為汗若邪正交
爭內外皆寔寒熱互呈故製大青龍干麻桂中加石膏
以瀉火是散而瀉之也吐劑有梔豉瓜蒂分胃中虛寔

之相殊下劑有大小承氣調胃抵當分氣血淺深之不
同利水有猪苓真武寒熱之懸絕清火有石膏連翹
輕重之差等陽氣虛加人參于附子吳茱萸中以引陽
陰氣虛加人參於白朮瀉心中以引陰諸法井然質之
岐伯纖毫不爽前聖後聖其揆一也愚更有議焉仲景
言平脈辨症爲傷寒雜病論是脈與症亦未嘗兩分也
夫因病而平脈則平脈即在辨症中病有陰陽脈合陰
陽發熱惡寒發于陽無熱惡寒發于陰是病之陰陽也
當列全論之首大浮動滑數名陽沉瀯弱弦微名陰是
脈之陰陽也此條當爲之繼叔和旣云搜採仲景舊論

錄其証候診脉是知叔和另立脉法從此搜採耳試觀
太陽篇云脉浮者病在表脉浮緊者法當身疼痛脉浮
數者法當汗出愈諸條脉法不入辨脉平脉篇是叔和
搜採未盡猶遺仲景舊格也由此推之知寸口脉浮爲
在表及寸口脉浮而緊脉浮而數諸條皆從此等處採
出脉有陰結陽結條未始不在陽明中風中寒之間潛
漸惡寒而發熱者未始不在少陽寒熱往來之部脉陰
陽俱緊者未必非少陰之文陰陽相搏條未必不在傷
寒脉結代之際設仲景另集脉法或有上下之分諒無
平辨之別矣名平各辨皆叔和搜採之說仲景所云各

承家枝者是也世徒知序例爲叔和之文而不知仲景之書皆係叔和改換獨爲傷寒立論十六卷中不知遺棄幾何而六經之文夾雜者亦不少豈猶然仲景舊集哉如疑余見之謬請看序例所引內經莫不增句易字彼尙敢改岐伯之經况乎仲景之論耶欲識真仲景者逐條察其筆法知考工記自不合于周官褚先生大不侔于太史矣世皆以金匱要畧爲仲景雜病論則有若之似聖人惟曾子爲不可強乎

傷寒論卷一
六經正義第二

按仲景自序云雖未能盡愈諸病其留心諸病可知故于諸病之表裏陰陽分爲六經今各得所司清理脉症之異同寒熱之虛寔使治病者只在六經中下手行汗吐下和解溫補等法而無失也夫一身之病俱受六經範圍者猶周禮分六官而百職舉司天分六氣而萬物成耳傷寒不過是六經中一症叔和不知仲景之六經是經界之經而非經絡之經妄引內經熱病論作序例以冠仲景之書而混其六經之政治六經之理因不明而仲景平脉辨症能盡愈諸病之權衡廢矣夫熱病之

六經專主經脈爲病但有表裏之定熱並無表裏之虛寒雖因于傷寒而已變成熱病故竟稱熱病而不稱傷寒要知內經熱病即溫病之互名故無惡寒症但有可汗可泄之法並無可溫可補之例也觀溫病名篇亦稱評熱病論其義可知矣夫叔和不干病根上請求但干病名上分解故序例所引內經既背仲景之旨亦舛岐伯之意也夫仲景之六經是分六區地面所該者廣雖以脈爲經絡而不專在經絡上立說凡風寒溫熱內傷外感自表及裏有寒有熱或虛或實無乎不包故以傷寒雜病合爲一書而總名爲傷寒雜病論所以六經提

綱各立一局不爲經絡所拘弗爲傷寒畫定也然仲景
既云撰用素問當於素問之六經廣求之按皮部論云
皮有分部脉有經紀其生病各異別其分部左右上下
陰陽所在諸經始終此仲景創六經部位之原又曰陽
主外陰主內故仲景以三陽主外三陰主內又曰陽在
者主內在陰者主出以滲于內故仲景又以陽明主內
少陰亦有反發熱者故仲景又于表劑中用附子是固
其滲也又曰少陰之陰名曰樞儒其入于經也從陽部
注于經其出者從陰部注于骨故仲景製麻黃附子湯
治發熱脉沉無裏証者是從陽部注經之義也製附子

湯治身體骨節痛手足寒背惡寒脉沉者是從陰內注
於骨之義也又陰陽離合論太陽爲開故仲景以之主
表而以脉浮惡寒頭項強痛爲提綱立言與熱論頗同
而立意自別陽明爲閤故以之主裏而以胃是爲提綱
雖有目痛鼻乾等症而所主不在是少陽爲樞少陰亦
爲樞故皆主半裏半表症少陽爲陽樞歸重在半表故
以口苦目眩爲提綱而不及于胃脇痛鞭少陰爲陰樞
其欲寐不寐欲吐不吐亦半表半裏症雖有舌乾口燥
等症而不入提綱歸重在半裏也豈唯陽明主裏三陰
皆主裡而陰陽異位故所主各不同陽明主裏症之陽

陽道寔故以胃寔屬陽明太陰主裏症之陰、道虛故以自利屬太陰太陰爲開又陰中至陰故主裡寒自利厥陰爲閤又爲陰中之陽故主裏熱衄逆少陰爲陰中之樞故所主或寒或熱之不同或表或裏之無定與少陽相似也請以地理喻六經猶列國也腰以上爲三陽地面三陽主外而本乎裏心者三陽夾界之地也內由心胸外自巔頂前至額顙後至肩背下及手足內合膀胱是太陽地面此經統領諸衛主一身之表症猶近邊禦敵之國也內自心胃至胃及膈外自額顙由面至腹下及於足是陽明地面由心至咽出口頰上耳目斜至

顛外自脇內屬胆是少陽地面比太陽羌近陽明猶京
畿矣腰以解三陰地面三陰主裡不及外腹者三陰夾
界之地也自腹由脾及二腹魄門爲太陰地面自腹至
兩腎及膀胱溺道爲少陰地面自腹由肝上膈至心從
脇肋下及小腹宗筋爲厥陰地面此經通行三焦主一
身之裡症猶近京夾輔之國也太陰陽明同居異治猶
周呂分陝之義四經部位有內外出入上下牽引之同
猶先王分土域民犬牙相制之理也若經絡之經是六
經道路非六經地面矣六經之有正邪客邪合病併病
屬脾屬胃者猶寇賊充斥或在本境或及隣國或入京

師也太陽地面最大內隣少陰外隣陽明故病有相關如小便不利本膀胱病少陰病而亦小便不利者是邪及太陽之界也腰痛本腎病太陽病而亦腰痛者是邪及少陰之界也六七日不大便及頭痛身熱者是陽明熱邪侵及太陽之界也頭強痛兼鼻鳴乾嘔者是太陽風邪侵及陽明之界也心胸是陽明地面而爲太陽之通衢因太陽主營衛心胃是營衛之本營衛環周不休猶邊邑之吏民士卒會于京畿往來不絕也如喘而胃滿者是太陽外邪入陽明地面而騷擾故稱爲太陽明合病若頭不痛項不強胃中痞鞭氣衝咽喉不得息

者此邪不自太陽來乃陽明寔邪結于胃中猶亂民聚于本境而爲患也心爲六經之主故六經皆有心煩証如不頭項強痛則煩不屬太陽不來往寒熱則煩不屬少陽不見三陰証則煩不屬三陰矣故心憤心怵惕心懊懣一切虛煩皆屬陽明以心居陽明之地面也陽明猶京師故心腹皆居其地邪在心爲虛煩在腹爲寔熱以心爲陽而屬無形腹爲陰而屬有形也夫人身之病動關心腹陽邪聚于心陰邪聚于腹肝爲陰中之陽故能使陰邪之箕搏于心陽明主在裏之陽故能使陽邪入聚於腹耳更請以兵法喻兵法之要在明地形必

先明六經之路總知賊寇所從來知某方是某府來路某方是某郡去路來路是邊關三陽是也去路是內境三陰是也六經來路各不同太陽是大路少陽是僻路陽明是直路太陰近路也少陰後路也厥陰斜路也客邪多從三陽來正邪多由三陰起猶外寇自邊關至亂民自內地生也明六經地形始得握百病之樞機詳六經來路乃得操治病之規則如以症論傷寒大寇也病從外來中風流寇也病因旁及雜病亂民也病由中起既認爲何等之賊又知爲何地所起發于其境便禦之本境強備御即雨路來攻如邪入太陽地面即汗而

散之猶陳利兵于要害乘其未定而擊之也邪之輕者在衛重者在營尤重者在宿腸猶寇之淺者在關外其深者在關上尤深者在關內也是麻黃爲關外之師桂枝葛根爲關上之師大小青龍爲關內之師矣凡外寇不靖內地盜賊必起而應之因立兩解法故有大小青龍及桂枝麻黃加減諸方如前軍無紀致內亂蜂起當重內輕外因有五苓十枣陷胃瀉心抵當等湯也邪入少陽地面宜雜用表裏寒熱攻補之品爲防禦解和之法如偏僻小路利于短兵不利于矛戟利于守備不利于戟爭也邪之輕者入腠理重者入募原尤重者入腠

胃小柴胡勝裡之劑也大柴胡募原之劑也小建中半
夏瀉心黃芩芍黃連四湯少陽脾劑也柴胡加芒硝龍蠅
二方少陽胃劑也如太陽少陽有合併病是一軍犯太
陽一軍犯少陽矣用柴胡桂枝湯是兩路分擊之師也
甚至三陽合併病是三面受敵矣法在獨取陽明陽明
之地肅清則太少兩路之陽邪不攻自解但得內寇寧
而外患自息此白虎之所由奏捷耳若陽邪不戢於內
地用大承氣以急下之是攻賊以護主若陰邪直入于
中宮用四逆湯以急救其裡是強主以逐寇也陽明爲
兩地陽明界上耶太陽少陽地面邪入陽明之界近太

陽地面雖不犯太陽太陽之師不得坐視而不救故陽明之營衛病即假麻黃桂枝等方以汗之邪近少陽地面雖不入少陽少陽之師不得高壘而無戰故陽明之腠理病即柴胡以解之是陽明之失守非太陽之不固即少陽之無條所以每々兩陽相合而爲病也若邪已在陽明地面必出師奮擊以大逐其邪不使少留故用捥鼓瓜蒂之吐法以迅掃之若深入內地不可復驅則當清野千里使無所標掠是又白虎得力處也若邪在內庭又當清宮除盜此二承氣所由取勝如茵陳豬苓輩又爲表里之師立法矣太陰亦內地少陰厥陰是太

陰之界也太陰居中州雖外通三陽而陰陽既已殊
塗心腹更有隔膜之藩蔽故寒水之邪泛太陽外屬者
輕由少陰內受者重風木之邪自少陽來侵者微因厥
陰上襲者甚如本經正邪轉屬陽明而爲是猶師老勢
窮可下之而愈如陽明是邪轉屬本經而成虛則邪盛
正衰溫補挽回者甚難蓋太陰陽明地面雖分並無阻
隔陽明猶受蔽之通衢甲兵所聚四戰之地也太陰猶
倉廩重地三軍所依亦盜賊之巢穴也故元氣有餘則
邪入陽明元氣不支則邪入太陰在陽明地面則陳師
鞠旅可背城借一取勝潰夷在太陰地面則焚劫積蓄

倉廩空虛裨腹之士無能禦敵耳厥陰之地相火遊行
之區也其平氣則爲少火若風寒燥濕之邪一入其境
悉化爲熱即是壯火其少火爲一身之生肌而壯火爲
心腹之大患且其地面通達三焦邪犯上焦則氣上撞
心心中疼熱消渴口爛咽痛喉痺逼入中焦則手足厥
冷脉微欲絕飢不欲食即吐衄移禍下焦則熱利下
重或便膿血爲害非淺邪跋扈之師矣傷寒製烏梅丸
方寒熱並用攻補兼施通理氣血調和三焦爲平治厥
陰之主方猶摠督內地之大師也其與之水以治消渴
茯苓甘草湯以治水多甘草湯以復脉當歸四逆以治

厥是間出鏡師分頭以救上焦之心主而安神明也用
白虎承氣輩清胃而平中焦之熱寔白頭翁四逆散清
脾而止下焦之熱利是分頭以救腹中之陰而扶胃腕
之元氣耳胃爲一府而分陰陽二經少陰一經而兼陰
陽兩藏者皆爲根本之地故也邪有陰陽而途蕪分陰
陽二氣如陽邪犯少陰之陽反發熱心煩咳渴咽痛陽
邪犯少陰之陰則腹痛自利或便膿血陰邪犯少陰之
陽則身體骨節痛手足逆冷背惡寒而身踰臥陰邪犯
少陰之陰則惡寒嘔吐下利清穀煩燥欲死仲景製麻
黃附子細辛黃連阿膠甘草桔梗猪膚半夏苦酒萆湯

禦陽邪犯少陰之陽也其製桃花猪苓等湯禦陽邪入少陰之陰也附子吳茱萸四逆等湯禦陰邪犯少陰之陽也通脈四逆茯苓四逆乾姜附子等湯禦陰邪入少陰之陰也少陰爲六經之根本而外通太陽內接陽明故初得之而反發熱與八九日而一身手足盡熱者是少陰陽邪侵及太陽地面也自利純清水心下痛口燥舌乾者少陰陽邪侵陽明地面也出太陽則用麻黃爲銳師而督以附子入陽明則全仗大承氣而不設監制猶兵家用繆導與用本部不同法也其陰邪侵入太陰則用理中四逆加人尿猪胆等法亦猶是矣嗟乎不思

仲景之所集安能見病知源也哉

合併微第三

病有定體故立六經而分司之病有變遷更求合病併病而互參之此仲景二法之盡善也夫陰陽互根氣雖分而神自合三陽之底便是三陰三陰之表則是三陽矣如太陽病而脉反沈便合少陰少陰病而反發熱便合太陽陽明脉遲即合太陰太陰脉緩即合陽明少陽細小是合厥陰厥陰微浮是合少陽雖無合併之名而有合併之寔或陽得陰而解陰得陽而解或陽入陰而危陰亡陽而逆種々脉證不可枚舉學者當於陰陽兩

症中察病勢之合不合更於三陽三陰中審其症之併
不併于以陰病治陽之病治陰扶陽抑陰瀉陽補陰等
法用之恰當矣三陽皆有發熱症三陰皆有下利症如
發熱而下利者陰陽合病也陰陽合病陽盛者屬陽經
則下利爲寔熱如太陽之明合病陽明少陽合病太陽
少陽合病必自下利用葛根黃芩芍藥湯者是也陰盛者
屬陰經則下利屬虛寒如少陰病吐利及發熱者不死
少陰病下利清穀裡寒外熱不惡寒而面色赤用通脈
四逆者是也若陽與陽合不合于陰即是三陽合病則
不下利而自汗出爲白虎症也陰與陰合不合于陽即

是三陰合病則不譫熱而吐利厥逆爲四逆症也併病與合病稍異者合則一時並見併則以次相乘如太陽之頭項強痛未罷遽見脈弦胸胃心下痞鞭等症是與少陽併病更見譫語即三陽併病矣太陽與陽明併病太陽症未罷者從太陽而小發汗太陽症已罷者從陽明而下之其机在惡寒惡熱而分也然陽明之病在胃家寔太陽之明合病喘而胸滿者不可下恐胃家未實耳若陽明與太少合病必自下利何以得稱陽明要知協熱下利即胃寔之始內經所云暴注下迫皆屬于熱其脈必浮大弦大故得屬之陽明而不繫太陰也若下

同清穀裏寒外熱脉浮而遲者則浮不得屬之于表而遲則爲在藏若見脉微欲絕即身不惡寒而面色赤者又當屬之少陰蓋太陰陽明下利之辨在清穀不清穀而太陰少陰之清穀又在脉之遲與微爲辨也夫陽明主胃寔而有協熱利太陰主下利清穀又因脉微細而屬少陰脉微下利反見陽明之不惡寒而面色赤若不于合併病察之安知病情之變遷如此而爲之施治哉然此爲六經之合併與內傷外感之合併神而明之不可勝極以陰陽互根之體見陰陽離合之用是知六經之準繩更屬定不定法矣何漫云三陰無合併病也哉

風寒辨惑第四

風寒二氣有陰陽之分又相因爲患蓋風中無寒即是和風一夾寒邪中人而病故得與傷寒相類亦得以傷寒名之所以四時皆有風寒而冬月爲重也傷寒中風各有重輕不在命名而在見症太陽篇言中風脉症者二一曰太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出齋く惡寒淅淅惡風翕く發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之一曰太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之以二症相較陽浮見寒之輕浮緊見寒之重汗出見寒之輕不汗出見寒之重

盛々漸漸見風寒之輕翕々見發熱之輕發熱惡寒熱之俱重鼻鳴見風之輕身疼見風之重自汗乾嘔見煩之輕不汗煩燥見煩之重也言傷寒脈症者二一日太陽病或未發熱或已發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒一日傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急以二症相較微惡寒見必惡寒之重體痛覺脚攣急之輕自汗出小便數心煩見傷寒之輕或未發熱見發熱之輕必先嘔逆見傷寒之重脈浮見寒之輕陰陽俱緊見寒之重中風傷寒各有輕重如此今人必以傷寒爲重中風爲輕但知分風寒之中傷而不辨

風寒之輕重于是有傷寒見風中風見寒之遁辭矣夫
風爲陽邪寒爲陰邪雖以皆於時氣之感而各不失其
陰陽之性故傷寒輕者全似中風獨脚攣不是益腰以
上爲陽而風傷於上也中風重者全似傷寒而煩躁不
是蓋寒邪嘔而不煩逆而不躁也然陰陽互根煩爲陽
邪煩極致躁爲陰邪躁極致煩故中風輕者煩輕中
風重者煩躁傷寒重者躁煩傷寒輕者微煩微煩則惡
寒亦微是微陽足以勝微寒故脉浮不緊矣如本經論
所云凡欲自解者必當先煩乃有汗而解以脉浮不緊
故知汗出解也若不待自解而妄攻其表所以亡陽因

陽微故耳凡傷寒見煩則寒氣欲解躁煩是陽爲寒鬱而邪轉盛故傷寒一日若躁煩者爲欲傳六七日躁煩者爲陽去入陰也因病人所稟之陽氣有不同而受邪之部位陰陽更不類故陽有多少熱有微甚如太陽爲先天之巨陽其熱發于營衛故一身手足壯熱陽明乃太少兩陽相合之陽其熱發於肌肉故蒸々發熱少陽爲半表半裏之陽其熱發於腠理時開時閉故往來寒熱此二陽發熱之差別也太陰爲至陰無熱可發因爲胃行津液以灌四旁故得主四肢而熱發于手足所以太陰傷寒手足自溫太陰中風四肢煩疼耳少陰爲封

豔之本若少陰不藏則坎陽無蔽故有始受風寒而脉
沉發熱者或始無表熱八九日未熱入膀胱致一身手
盡熱者厥陰當兩陰交盡一陽之初生其傷寒也有從
陰而先厥後熱者從陽而先熱後厥者或陽進而熱多
厥少或陽退而熱少厥多或陰陽和而厥與熱相應者
是三陰發熱之差別也太陽爲父多陽盛之病如初服
桂枝而反煩解半日許而復煩下之而脉仍浮氣上衝
與不汗出而煩躁服藥微除而煩瞑發衄者皆陽氣重
故也少陰爲雌多亡陽之病如下利清穀手足厥逆脉
微欲絕惡寒踰卧吐利汗出裏寒外熱不煩而躁皆亡

陽故也又內經病形篇云邪中于項則下太陽中于面則下陽明中于顙則下少陽其中膺背兩脇分中其經故本論太陽受邪有中背中項之別中項則頭項強痛中背則背強几々也陽明有中面中膺之別中面則目痛鼻乾中膺則胸中痞鞭也少陽有中顙中脇之別中顙則口苦咽乾中脇則脇下痞鞭也此岐伯中陽溜經之義又云中于陰從臂肘始自經及臑々氣寔而不能容則邪還于府故本論三陰皆有自利症是寒邪還府也三陰皆有可下症是熱邪還府也此岐伯中陰溜府之義六經之部位有高下故受邪之日有遠近太陽爲

三陽居表位最高最易傷寒故一日受陽明爲二陽而居前故二日受少陽爲一陽而居側故三日受太陰爲三陰居陰位最高故四日受少陰爲二陰居陰位之中故五日受厥陰爲一陰居三陰之盡故六日受此皆言見症之期非六經以次相傳之日也內經曰氣有高下病有遠近適其至所即此意也按本論傳字之義名々不同必牽強爲傳經則謬傷寒一日太陽受之脉若靜者爲不傳是指執傳本經不是傳陽明之經終陽明無所復傳始雖惡寒二日自止是指寒傳本經不是傳少陽之經絡傷寒二三日陽明少陽症不見者爲不傳皆

指此傳不經不是二日傳陽明三日傳少陽之謂太陽
病至七日以上自愈者以行其經盡故也言七日當來
復之辰太陽一經之病當盡非日傳一經七日復傳太
陽之謂若復傳則不當曰盡若日傳一經則不當曰行
其經矣若欲再作經是太陽不罷而併病陽明傳經不
傳是使陽明之經不傳太陽之熱非再傳少陽之謂也
太陽與陽明少陽地位相近故太陽之盛而不罷便轉
屬陽明陽已衰而不罷便轉繫少陽若陽陷則轉繫太
陰陽虛則轉入少陰陽逆則轉入厥陰矣陽明萬物所
歸故六經皆得轉屬而陽明無所復傳是知太陽之明

無轉屬少陽之症陽明太陰俱屬于胃之寔則太陰轉屬陽明胃虛則陽明轉屬太陰矣少陽與二陰地位相近受太陰之寒則吐利清穀受厥陰之熱則咽痛便血也厥陰爲陰之盡亦如陽明之無所復傳然陰出之陽則熱多厥少陰極亡陽則熱少厥多此即少陽往來寒熱之變局也按本論云太陽病發熱汗出惡風脈緩者爲中風又云太陽中風脈浮緊不汗出而煩躁又云陽明中風脈弦浮太不得汗合觀之不得以無汗爲非中風矣本論云太陽病或未發熱或已發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者名傷寒而未嘗言無汗又云太陽

病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之此不冠以傷寒又不言惡寒又云傷寒脉浮自汗出微惡寒合觀之又不得以有汗爲非傷寒矣人但據桂枝條之中風自汗而不究傷寒亦有自汗出者強以麻黃症之無汗爲傷寒而不究中風最多無汗者謂傷寒脉浮緊中風脉浮緩而不知傷寒亦有浮緩中風亦有浮緊者知三陽脉浮三陰脉沉而不知三陰皆有浮脉三陽亦有沉脉者總是據一條之說不理會全書耳當知麻黃湯大青龍湯治中風之重劑桂枝湯葛根湯治中風之輕劑傷寒可通用之非主治傷寒之劑

也世皆推桂枝爲中風主劑而不敢以大青龍湯爲中風之劑者是惑於中風見寒傷寒見風之謬不敢以麻黃湯爲中風之劑者是泥于有汗爲中風無汗爲傷寒之謬也風爲陽邪因四時之氣而交遷且一日亦具四時之氣運更有鬱復淫勝之不同故有麻黃桂枝葛根青龍等法當知四時俱有中風俱有傷寒不得拘春傷于風冬傷于寒之一說矣大陽經多中風方如麻黃桂枝葛根大青龍湯是也少陰經多傷寒方如麻黃附子細辛直武附子茱萸白通四逆通脈等湯是也中風諸方可移治傷寒傷寒諸方不可治中風者寒可溫而

風不可以熱治也風爲陽邪故中風者雖在少陰得多陽症寒爲陰邪故傷寒者雖在太陽每多陰症太陽經多中風症陽從陽也少陰經多傷寒症陰從陰也夫風者善行而數變故脉症皆不可拘自變者觀之其症或自汗鼻鳴或無汗而喘或不汗出而煩躁或下利嘔逆或渴欲飲水或往來寒熱或口苦咽乾或短氣腹滿鼻乾嗜卧或目赤耳聾胸滿而煩或四肢煩疼種々不同其脉或浮緊或浮緩或弦而浮大或陽微陰濇或陽微陰浮亦種々不同自不變者觀之惟浮是中風之主脉惡風是中風之定症蓋風脉變態不常而浮爲真休風

症變幻多端而惡風其真情也仲景廣設諸方以曲盡其變耳夫寒之傷人有三早晚霧露四時風雨冬春霜雪此天之寒氣也幽居曠室磚地石堦大江深澤邃谷高山地之寒氣也好飲寒泉喜食生冷酷嗜瓜果誤服冷藥人之寒氣也此義最淺傷寒諸書莫之或及而以冬寒春溫時疫之三症掩之何不求致病之因而歸時令之變耶夫寒固爲冬氣三時豈必無寒第寒有輕重不拘定于冬溫固爲春氣而三時亦病溫且溫隨時而發者多因冬月傷寒所致者少不可謂必然之道也即冬時病溫亦因其人陰虛而發豈冬時之煖氣卽有毒

以傷人乎若時行疫氣上天地溫熱之毒如涼風一起
疫邪自散豈遇寒而反重耶疫與寒如風馬牛不相及
何得以寒冠時行之疫若爲暴寒所折而病即是三時
之傷寒勿得妄以疫名之矣謂三四月陽氣尚弱爲寒
折而病熱輕五六月陽氣已盛爲寒折而病熱重七八
月陽氣已衰爲寒折而病熱微此叔和之莫須有也夫
病寒病熱當審其人陰陽之盛衰不得拘天氣之寒熱
天氣之寒熱傷人必因其人陰陽之多少元氣之虛寔
輕重不全憑時令之陰陽爲轉移也所以仲景製方全
以平脉辨症爲急務不拘于受病之因不拘于發病之

時爲施治如夏月盛暑而傷寒吐利多有用姜附吳萸而始効隆冬嚴寒而病溫多有用石膏硝黃而熱乃解者麻黃桂枝二湯只宜于冬月之正傷寒三時不可輕用其失豈才多乎夫開口言傷寒動手反用寒涼尅伐之劑曷不于傷寒二字顧名思義耶寒傷于表法當溫散寒傷于裏法當溫補仲景治傷寒只有溫散二法其清火涼解吐下等法正爲溫暑時疫而設所以治熱非以治寒治熱淫于內非治傷寒于表也今傷寒家皆曰仲景治溫治暑必另有法治今遺失而無徵傷寒只有汗吐下三將溫補正法置之不用反曰治傷寒無補法于

是人傷于天地之寒者輕傷于醫師之法者重死于飲食之內傷者少死于寒藥之內傷者多耳

溫暑指歸第五

內經論傷寒而反發熱者有三義有當時即發者曰人傷于寒則爲病熱也有過時發熱者曰冬傷于寒春必病溫也有隨時易名者曰凡病傷寒而成溫者先夏至日爲病溫後夏至日爲病暑也夫病溫病暑當時即病者不必論凡病傷寒而成者其病雖出于冬時之傷寒而根是種于其人之鬱火內經曰藏于精者春不病溫此明冬傷于寒春必病溫之源先夏至日爲病溫後

夏至日爲病暑申明冬不藏精夏必病溫之故夫人傷
于寒則爲病熱其恒耳此至春夏而病者以其人腎陽
有餘好行淫慾不避寒冷雖外傷于寒而陽氣足以禦
之但知身著寒而不爲寒所病然表寒雖不得內侵而
虛陽亦不得外散仍下陷入陰中故身不知熱而亦不
發熱所云陽病者上行極而下也冬時行收藏之令陽
不遽發寒愈久則陽愈匿陽日盛則陰日虛若寒日少
而蓄熱淺則陽火應春氣而病溫若寒日多而鬱熱深
則陰火應夏氣而病暑此陰消陽長從內而達于外也
叔和不知此義謂寒毒藏于肌膚至春變爲陰病至夏

變爲暑病夫寒傷于表得熱則散何以能藏設無熱以
禦之必深入府藏何以只藏于肌膚且能藏者不能變
何以時換而變其所藏乎不知原其人之自傷而但咎
其時之外傷祇知傷寒之因不究熱傷之本妄擬寒毒
之能變熱不知內陷之陽邪發見其本來之面目也又
謂辛苦之人春夏多溫熱病者皆因冬時觸寒所致而
非時行之氣不知辛苦之人動搖筋骨凡動則爲陽往
往觸寒即散或因飢寒而病者有之或因勞倦而發熱
者有之故春夏之時辛苦之人因虛而感時行之氣者
不少矣若夫春夏之溫熱由冬時觸寒所致者偏在飽

煖淫慾之人不知持滿解以入房以慾絕其精以耗散
其真陽強不能密精失守而陰虛故遺禍至于春夏也
內經論溫之脉症治法甚詳學者多不得要領仲景獨
挈發熱而渴不惡寒者爲捻提綱悉溫病之底蘊合內
經冬不藏精之旨矣熱病以口燥熱舌乾而渴屬少陰
少陰者封蟄之本精之處也少陰之表名曰太陽太陽
根起于至陰名曰陰中之陽故太陽病當惡寒此發熱
而不惡寒是陽中無陰矣而即見少陰之渴太陽之根
本悉露矣于此見逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沉孤陽
無附而發爲溫病也溫病症治散見六經謂類推之如

傷寒發熱不渴服湯已渴者是傷寒溫病之別也寒去而熱罷即傷寒欲解症寒去而熱不解是溫病發見矣如服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者即是溫勢得瀦用白虎加人參預保元氣于清火之時是凡病傷寒而成溫者之正治法也因所傷之寒邪隨大汗而解所成之溫邪隨大汗而發焉得無虛設不加參則熱邪因白虎而解安保寒邪不因白虎而采乎是傷者當補治病必求其本耳抑服柴胡已渴者屬陽明也以法治之夫柴胡湯有參甘苓粳皆生津之品服已反渴是微寒之劑不足以解溫邪少陽相火直起陽明也是當

用白虎加人參法若柴胡加參之法非其治矣夫相火
寄甲乙之間故肝胆爲發溫之源腸胃爲市故陽明爲
成溫之藪陽明始雖惡寒二日即止即不惡寒而反惡
熱此亦病傷寒而成溫之一徵也若夫溫熱不因傷寒
而致者只須扶陰抑陽不必補中益氣矣且溫邪有淺
深治法有輕重如陽明病脈浮發熱渴欲水小便不利
者猪苓湯主之瘧熱在裏不得越身休熱黃渴欲飲
水小便不利者茵陳湯主之少陰病得之二三日口燥
咽乾者大承氣湯急下之厥陰病下利欲飲水者白頭
翁湯主之此仲景治溫之大畧也夫溫與暑偶感天時

而病者輕因不藏精者此爲自傷其病重若再感方土
之戾氣此三氣相合而成溫疫也溫熱利害只在一人
溫疫移害禍延隣里令人不分溫熱溫疫渾名溫病令
人惡聞而諱言之因于辭之害義矣吳又可溫疫論程
郊倩熱病註俱有至理可傳愚不復贅餘義詳見方論
錄細查

瘧濕異同第六

六氣爲病皆能發熱然寒與熱相因暑與濕相繼獨燥
與濕相反風寒溫暑皆因天氣而濕病多得之地氣燥
病多得之內因此病因之殊同也內經病机十九條其

分屬六氣者火居其穴八風寒濕各居其一燥症獨無
若諸瘧項強皆屬於濕愚嘗疑其屬燥今本論有瘧濕
之分又曰太陽病發汗太多因致瘧則瘧之屬燥無疑
也夫瘧以壯命名因血虛而筋急耳六氣爲患皆足以
致瘧然不熱則不燥不燥則不成瘧六經皆有瘧病須
審部位以別之身已後者屬太陽則凡頭項強急項背
几几脊強反張腰似折髀不可以曲腦如結皆其症也
身之前者屬陽明頭面動搖口噤齒齧缺盆紐痛腳絳
急皆其症也身之側屬少陽目眼喎斜手足牽引兩脇
拘急手足不遂皆其症也若腹內拘急因吐利而四肢

拘急是太陰瘧惡寒踈臥凡以代瘧者以代頭俯而不能仰者是

少陰病瘧者丸上升宗筋下注少腹裏急陰中拘攣膝
脛拘急者厥陰瘧也若瘧之扶風寒者其症發熱無汗
而惡寒氣上中留而小便少其脉必堅緊其壯必強直
而口噤此得之天氣內經所云諸暴強直皆屈于風者
是也其勢勇猛故曰剛瘧病因外來當逐邪而解外瘧
有挾木邪而爲患者其邪從內出故發熱汗出而不惡
寒其脉沉遲其狀則項強凡此得之地氣內經所云
諸瘧項強皆屬於濕者是也其勢更弱故名柔瘧病因
于內當滋陰以和內要知屬風之瘧不因風而因熱屬

濕之瘕不因濕而因燥治風君葛根治濕君恬萎根者
非以治風寔以生津非以治濕寔以潤燥耳夫瘕之始
也本非正病必夾雜于他病之中人之病此者世醫悉
拮爲風所以不明其理善医者必于他症中察審而豫
防之如頭項強痛即瘕之一端是太陽之血虛故筋
急也今人但知風寒不惜津液所以發汗太多因致瘕
者多矣夫瘕之微本有由來一絳妄治即奇形雖見項
背強几是瘕之微兆故用葛根身體強是瘕狀已著
故用括萎根卧不著席脚挛急口噤齒齟是瘕之極甚
故用大黃芒硝無非取多津多液之品以滋養營血不

得與當汗當下者同例也。觀傷寒脈浮自汗心煩惡寒而見脚挛急是瘧勢已成便當滋陰存液不得仍作傷寒主治故與桂枝則厥與芍藥甘草湯其脚即伸此明驗矣。第以表症未除不得用承氣。若譌語者少與調胃承氣是又與不着席者與大承氣同一機杼也。凡瘧之為病因外邪傷筋者少因血虛筋急者多如誤作風治用辛散以助陽則真陰愈虛用燥劑以驅風則血液愈涸故瘧得之暴起者少妄治而致者多虛而不補不死何待非參芪歸地調和營衛未易平瘧而奏捷也。內經曰諸濕腫滿皆屬於脾又曰濕勝則濡泄此指濕傷于

內者言也又曰地之濕氣感則害人皮肉筋骨又曰因于濕首如裹此指濕傷于外者言也若濕而無熱則大筋更短而爲拘小筋弛長而爲癢即柔痿之交見矣陽明篇有濕熱發黃之症叔和不爲別論獨取太陽之風濕相搏者尚遺數條亦搜採之疎失也內經曰身半以上者風中之也身半以下者濕中之也中陽則溜于經中陰則溜于府又曰陽受風氣陰受濕氣故傷于風者上先受之傷于濕者下先受之皆風濕對言本論則風濕合言也風濕相合則陰陽相搏上下內外交病矣所以身半煩疼不能轉側骨節掣痛不能屈伸小使不利

人便反快也內經曰風濕之傷人也血氣與邪并名於分腠之間其脉堅大故曰寔寒濕之中人也皮膚不收肌肉堅緊營血滯衛氣去故曰虛此又以濕家虛寔因風寒而分也本論傷寒發汗濕在裏不解身自爲黃與陽明之熱不得越於熱在裏身體發黃者當下不當下邪以寒濕爲熱分虛寔矣內經以風寒濕三氣合而各痺本論又云合風寒濕熱四氣而名濕痺當知痺與痿皆由濕變夫同一濕也濕去燥極則爲痿久留而著則爲痺爲寔痿爲虛痿痺異形虛寔亦殊固不得妄以痿屬風亦不得因于濕竟視痿爲濕矣痿燥餘義詳內

經註及本論註中

平脉準繩第七

上古以三部九候決死生是徧求法以人迎寸口趺陽
辨吉凶是扼要法自難經獨取寸口之說行人迎趺陽
不參矣氣口成寸爲脉之大會死生吉凶係焉令所傳
者只此耳自有脉經以來諸家繼起各以脉名取勝泛
而不切漫無指歸夫在說法取其約於脉名喜其繁此
仲景所云馳競浮華不固根本者是也仲景立法只在
脉之体用上推求不在脉之名目上分疏故以陰陽爲
体則以浮大動滑數爲陽之川沉濡弱弦遲爲陰之用

以表爲^表體則以浮爲表用沉爲裏用以藏府爲體則以
數爲府用遲爲藏用如以浮沉爲體則以浮沉中各
有遲數爲用以浮爲體則以大動滑數爲用之常濡弱
弦遲爲用之變以沈爲體則以濡弱弦遲爲用之常大
動滑數爲用之變體用之間見脉之變化而致病之因
與情病之虛寔病机之轉移亦隨之而見全在診者精
法之巧與看法之細耳脉理浩繁大綱不外名陽名陰
之十種陰陽兩分自成對峙陰陽配偶惟見五端浮沉
是脉体大弱是脉勢滑濇是脉氣動弦是脉形遲數是
脉息不得繫以脉象視之也脉有對看法有正看法有

反看法有平看法有側看法有徹底看法如有浮即有沉有大即有弱有滑即有瀯有數即有遲合之于病則浮爲在表沉爲在裏太爲有餘弱爲不足滑爲血多瀯爲氣少動爲搏陽弦爲搏陰數爲在府遲爲在藏此對看法也如浮大滑動數脉氣之有餘者爲陽當知其中有陽勝陰病之机沉弱瀯弦遲脉氣之不足者名陰當知其中有陰勝陽病之机此正看法也夫陰陽之轉旋也有餘而往不足隨之不足而往有餘從之故其始也爲浮爲大爲滑爲動爲數其繼也反沈反弱反瀯弦反遲者反是陽消陰長之机其病爲進其始也爲沈爲弱

爲滿爲弦爲遲其紐也微浮微大微滑微動微數者是
陽進陰退之机其病爲欲愈此反看法也浮爲陽如更
兼大動滑數之陽脉是爲純陽必陽盛陰虛之病矣沉
爲陰而更兼弱澹弦遲之陰脉是爲重陰必陰盛陽虛
之病矣此爲平看法如浮而弱浮而濡浮而弦浮而遲
者此陽中有陰其人陽虛而陰脉伏于陽脉中也將有
亡陽之變當以扶陽爲急務矣如沉而大沉而滑沉而
動沉而數此陰中有陽其人陰虛而陽邪下陷于陰脉
中也将有陰竭之患當以存陰爲深慮矣此爲側看法
如浮大動滑數之脉体雖不變然始爲有力之強陽終

爲無力之陽微知陽將絕矣沉瀯弱弦遲之脉雖喜變而爲陽如急見浮大動滑數之狀是陰極似陽知反照之不長餘燼之易滅也是爲徹底看法更有真陰真陽之看法如凡陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死也成註只據傷寒立言現凡字則知脉法不專爲傷寒設亦不是接承上文擴充之見仲景活法矣脉以胃氣爲本玩名陽名陰見此等脉狀尙是陰陽之名而非陰陽之寔因胃氣稍虛則陰陽偏重較之平脉有餘名陽不足名陰耳此陽病無外傷六氣言陰病無內傷精氣言若專指傷寒之陰症陽症則淺矣陽脉指胃腕之真陽內

經所謂二十五陽者是也陰病見陽脉是胃氣未復五
藏沖和之氣發見故主生內經所云別于陽者知病起
時也陰脉指五藏之真陰因胃皖之陽不至于手太陰
五藏之真陰來見也陽病見陰脉是脉無胃氣故主死
內經所云別于陰者知死生之期也要見沉滑弱弦遲
是病脉不是死脉其見于陽病眾多陽病浮大動滑數
不休卽是死脉陰病見浮大動滑數之脉多陰極似陽
未必卽可生之机也若真藏脉至如肝脉之中外急心
脉堅而搏肺脉大而浮腎脉如彈石脾脉如距喙皆反
見有餘之象豈可以陽脉名之經曰邪氣未也繁而疾

穀氣未也徐而和則又不得以遲數論陰陽矣仲景表裏藏府之法則又以浮沉遲數為大綱浮沉是審起伏遲數是察至數浮沉之間遲數寓焉凡脉之不浮不沉而在中不遲不數而五至者謂之平脉是有胃氣可以神求不可以象嫌若一見浮沉遲數之象斯為病脉浮沉遲數本不以表裏藏府分今既有陰陽之可名卽以陽表陰裏府陽藏陰定其為陰陽所在耳試觀脉之浮為在表應病亦為在表然浮亦有裏症或表邪初陷或裏邪欲出究竟不離于表故主表其大綱也沉象為在裏應病亦在裏沉脉亦有表症或陽病見陰而危或陰出

之陽而愈者竟病根于裏故主裏太剛也其數為陽主熱而數有浮沉浮數應表熱沉數應裡熱雖數脈多有病在藏者然其由必自府蓋六府為陽脈繫其府故主府其大綱也遲為陰主寒而遲有浮沉浮遲應表寒沉遲應裏寒雖遲脈多有病在府者然其根必自藏蓋五藏為陰脈繫其藏故主藏其大綱也脈狀種々總該括于沉浮遲數然四者之中又以獨浮獨沉獨遲獨數為準則而獨見何部即以其部定表裏藏府之斷斯病無遁情矣然陰陽之十脈表裏藏府之四診皆指脈之休用而言而診法之休用則又以病為休而脈

為用矣請以浮脉言之其他可類推如脉浮者病在表則必有發熱惡寒之表症然浮有不同有但浮者其三部皆同息數無遲數其氣象亦無滑濡動弦大小此太陽之脉倅然也因風寒在表而脉陽之陽禦之內無太過不及之病故見此象此病脉中之平脉故可用麻黃湯發汗而煩解然此脉不可多得所以發熱即有發熱之脉象惡寒即有惡寒之脉象如寸口脉浮而緊是浮為風象緊為寒象也此為陽中有陰乃陽脉之變見矣然寒不協風則玄府不開寒在皮毛衛氣足以衛外而為固雖受寒而不傷寒去而身自和矣若風不夾寒但

能鼓動衛氣使元府不閉反膚受邪肺氣不清而已不能深入于營而發熱惡寒頭項骨節俱痛惟風夾寒邪其勢始猛此風則傷衛寒則傷營非有二義也衛氣不能衛外反內擾營氣而爲煩營氣不得交通內迫于骨節而作痛營衛俱病發熱所由來耳如脉浮而數爲陽中見陽是陽脉之正局然不得認爲陽脉有餘是因陽氣不足反見有餘之象也夫脉爲血府寔由氣行長則氣治短則氣病弦脉象長數脉象短脉數因于氣之不足則數爲虛可知風爲陽邪風則爲熱虛因寒邪虛則爲寒虛寒相搏于營衛之氣不足以禦之此惡寒所

由來也上條陽中有陰而反微其發熱此條陽中見陽而反微其惡寒是互文以見意此二條皆當發汗而與但浮者不同故又曰脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲不可發汗以營氣不足血少故也可知用麻黃湯專治寒傷營者皆仲景法矣又云脉浮數者法當汗出而愈若尺中脉微此裏虛不可發汗則又見脉浮數者不得竟用麻黃湯又云傷寒解半日許煩後脉浮數者可更發汗宜桂枝湯則所云須表裏寔津液自和便自汗出愈者爲欬稀熱粥示法耳夫人之尺脉如樹之有根不拘浮數浮微示法耳浮緊皆據尺脉

以者虛是此又仲景自作浮為在表之註疏矣十脉中
無緊脉即弦之轉旋當知按之不移是靜為陰之体轉
旋無常是動為陽之用故浮中見緊者係在中風與傷
寒之陰陽緊者殊矣緊又俱與數相似緊見于法象數
見于至數然緊以氣來之長反得為陰中有陽之寔脉
數以氣來之短反得為陽中有陰之虛脉也若脉浮而
是陽中見陽此兩陽合明之脉然脉浮不遽大必至三
日乃大是陽明内熱外見之脉此浮不得仍為在表當
知大為病進故見心下反鞭即攻之不令發汗耳若浮
脉而遲面熱赤而戰慄者是陽中見陰故面見假熱而

身見真寒此因遲為在藏故無陽不能作汗而浮為在表則又當用瀉形為汗之法矣遲因浮而從表浮因大而從裏浮無數而反虛緊入浮而成寔則表裡藏府陰陽虛寔之間悉屬定不定法也餘義見六經病解